

Laura Martos Torrecilla¹, Dana Roxana Ionica¹, Daniel Santos Blázquez¹

SAMUR- Protección Civil¹

22 y 23 noviembre 2019

MADRID

22 y 23 noviembre 2019

MADRID



Aumentar la **supervivencia de la parada cardiaca** es posible

INTRODUCCIÓN

Cuando una persona sufre una Parada Cardiorrespiratoria (PCR) todos los recursos sanitarios se vuelcan en poder restablecer el funcionamiento del corazón de la persona, es decir, las intervención se centran en la víctima primaria del suceso. No obstante, no son la única víctima del suceso. Las víctimas secundarias son los familiares, amigos, testigos, etc. que se encuentran presentes en el momento de la intervención o a quienes hay que comunicar lo ocurrido, y que se ven también afectados emocionalmente.

El objetivo de este estudio es describir a la víctima secundaria atendida por los psicólogos de un servicio de emergencias extrahospitalario tras una PCR.

METODOLOGÍA



Estudio descriptivo retrospectivo de las víctimas secundarias de la PCR en un servicio de emergencias extrahospitalarias durante el año 2018, mediante la revisión de los informes asistenciales realizados por los psicólogos de guardia. Se incluyen tanto a los pacientes con los que se estaban realizando maniobras de RCP como los que finalmente fallecieron y hubo que realizar comunicación de malas noticias.

VARIABLES ESTUDIADAS: **sexo, edad, parentesco con la víctima primaria, lugar de la asistencia y tiempo de la intervención psicosocial.**


RESULTADOS



N=292



Tiempo medio de intervención:
2 horas



CONCLUSIONES

Una adecuada intervención psicosocial con las víctimas secundarias pueden ayudar a un adecuado afrontamiento de la crisis, lo cual incluye el manejo adecuado de los sentimientos y las reacciones, además de prevención de sintomatología ansiosa y depresiva en el futuro.