



# PERFIL DEL PACIENTE ATENDIDO POR AUTOLISIS TRAUMÁTICA Y NO TRAUMÁTICA POR SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. AÑO 2004

BEJERANO GARCÍA, R; ÁLVAREZ AYLLÓN, G; GARCÍA TALAVERA, M<sup>a</sup> C;  
FERRERAS NOGALES, F; MEMBRILLA ORTEGA, R

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

## INTRODUCCIÓN:

Reconocer a un paciente con riesgo de suicidio es una de las tareas más difíciles a las que ha de enfrentarse el personal sanitario. El intento suicida no siempre está relacionado con un deseo de acabar con la propia vida. El coeficiente de suicidio en nuestro país asciende a 10 de cada 100.000 habitantes. Las tentativas de suicidio presentan una frecuencia mayor (10-20 veces) que los suicidios consumados, y por lo tanto serán más frecuentemente atendidas por los servicios de emergencias. Del 15-30% de los pacientes que se autolesionan repiten la conducta antes del año. Entre el 25 y 50% de los actos consumados cuentan con intentos previos.

## OBJETIVOS:

Describir el perfil de la población atendida por Autolisis Traumática y No Traumática por Samur-Pc durante el año 2004.

Analizar la presencia/ausencia de factores de riesgo asociados con una mayor probabilidad de suicidio.


## RESULTADOS:

169 pacientes atendidos, de los cuales:


CASOS SEGÚN NACIONALIDAD




ACTITUD DURANTE LA ASISTENCIA




## POSIBLE MOTIVACIÓN



CASOS POR SEXO



MÉTODO EMPLEADO



## CONCLUSIONES:

El paciente con riesgo de suicidio es una persona con un sufrimiento intenso al que siempre debemos tomar muy en serio a pesar de la escasa letalidad de los métodos autolesivos empleados. De ahí la importancia, por parte del profesional sanitario, de una eficiente observación de las variables de riesgo asociadas al intento autolítico para la elaboración de una historia clínica completa que proporcione el mejor manejo posible de la situación y una mejor transferencia hospitalaria.