

Valores medios de los contaminantes atmosféricos detectados en el aire de Madrid durante 1983

MESES	SO ₂ (1) µg/m ³	Part. susp. (1) µg/m ³	CO (1) mg/m ³	Oxidos nitr. totales µ/m ³	NO ₂ (2) µg/m ³
Enero	186	122	8,2	—	—
Febrero	113	76	5,4	—	—
Marzo	84	59	6,3	—	—
Abril	57	34	5,8	195	81
Mayo	55	48	5,0	157	76
Junio	54	61	6,4	148	69
Julio	56	53	4,6	153	72
Agosto	51	47	4,1	147	68
Septiembre	59	64	7,2	189	75
Octubre	66	71	8,0	286	106
Noviembre	82	65	7,5	218	72
Diciembre	130	98	7,6	254	88
Primer trimestre	128	86	6,6	—	—
Segundo trimestre	55	48	5,7	167	75
Tercer trimestre	93	78	7,7	253	89
Media anual	81	67	6,3	194 (9 meses)	79 (9 meses)

(1) Detección automática por Red de Control.

(2) Detección manual mediante análisis en laboratorio que se comenzaron a realizar en abril de 1983.

µg/m³: microgramos por metro cúbico de aire.mg/m³: miligramos por metro cúbico de aire.