

Proporción entre sí del número de fallecidos, según sus edades y las causas de su defunción.

ENFERMEDADES	EDAD DE LOS FALLECIDOS				TOTAL	Proporción por cada cien fallecidos.	
	Menores de 1 año.....	De 1 a 4 años.	De 5 a 30 años.	De 30 años en adelante....			
Infectocontagiosas.....	Fiebre tifoidea.....	»	2	57	2	61	0'41
	Tifus exantemático.....	»	»	»	»	»	»
	Paludismo.....	»	»	3	»	3	0'02
	Viruela.....	3	»	»	»	3	0'02
	Sarampión.....	10	20	1	»	31	0'21
	Escarlatina.....	3	34	12	»	49	0'33
	Coqueluche.....	9	12	2	»	23	0'15
	Difteria.....	6	22	3	»	31	0'21
	Gripe.....	16	29	71	74	190	1'28
	Erisipela.....	8	»	8	13	29	0'19
Tuberculosas....	Otras epidémicas.....	1	1	7	1	10	0'07
	Tuberculosis pulmonar.....	24	48	1.347	123	1.542	10'35
	Meningitis tuberculosa.....	30	77	102	»	209	1'40
	Otras tuberculosas.....	4	19	159	25	207	1'39
Cerebro y sus cubiertas.....	Cancerosas.....	»	1	433	424	858	5'76
	Meningitis simple.....	197	219	170	4	590	3'96
	Congestión, hemorragia y reblandecimiento cerebrales.....	6	6	213	581	806	5'41
Aparato respiratorio.....	Orgánicas del corazón.....	6	8	513	810	1.337	8'97
	Bronquitis aguda.....	296	153	87	96	632	4'24
	Bronquitis crónica.....	3	9	155	426	593	3'98
	Pulmonía.....	95	41	197	128	461	3'09
	Bronconeumonía y otras.....	217	264	608	507	1.596	10'71
	Enteritis (menores de dos años).....	557	131	»	»	688	4'62
	Apendicitis y tifitis.....	1	1	64	8	74	0'50
	Cirrosis hepática.....	»	»	97	75	172	1'15
	Nefritis y mal de Bright.....	6	18	255	363	642	4'31
	Puerperales, parto y embarazo.....	»	»	88	»	88	0'59
Otras causas.....	Debilidad congénita y vicios de conformación.....	357	24	»	»	381	2'56
	Senectud.....	»	»	»	513	513	3'44
	Muertes violentas(excepto el suicidio).....	1	11	175	38	228	1'53
	Suicidios.....	»	»	48	16	64	0'43
	Otras causas.....	223	180	1.489	897	2.789	18'72
	TOTAL.....	2.079	1.333	6.364	5.124	14.900	»
	Proporción por 100.....	13'95	8'95	42'71	34'39	»	»

Mortalidad infantil.

Según puede verse al examinar las dos primeras columnas del cuadro anterior, la mortalidad infantil alcanzó la cifra de 2.079 defunciones de menores de un año y de 1.333 de los comprendidos a partir de la expresada edad a la de cinco años; lo cual representa el 13'95 por 100 de la totalidad de las defunciones ocurridas para los del primer grupo y el 8'95 para los del segundo, habiendo sufrido una baja considerable en relación con la correspondiente al año anterior, en que las indicadas proporciones se elevaron al 16'76 y 13'43 por 100, respectivamente.

En las edades superiores, es decir, las formadas por las diversas agrupaciones de cinco a sesenta años y de esta última a ochenta y más años, ha ocurrido lo contrario, toda vez que en el año que venimos estudiando, o sea el de 1927, la proporción por 100 lo fué de 42'79 y 34,39, y en el anterior, 1926, de 40'69 y 29'12, lo que supone un retroceso muy considerable.