

Causas frecuentes de mortalidad infantil comparadas con el año anterior.

ENFERMEDADES	EN 1927			EN 1926			DIFERENCIA EN 1927	
	Menores de 1 año.	De 1 a 4 años.	TOTAL	Menores de 1 año.	De 1 a 4 años.	TOTAL	Menos.	Más.
Viruela.....	3	»	3	1	»	1	»	2
Sarampión.....	10	20	30	86	189	275	245	»
Escarlatina.....	3	34	37	7	80	87	50	»
Coqueluche.....	9	12	21	9	10	19	»	2
Difteria.....	6	22	28	18	53	71	43	»
Erisipela.....	8	»	8	12	1	13	5	»
Tuberculosas.....	58	144	202	62	180	242	»	32
Sífilis.....	46	4	50	80	2	82	32	»
Meningitis simple.....	197	219	416	224	283	507	91	»
Eclampsia infantil.....	65	37	102	93	52	145	43	»
Aparato respiratorio.....	602	416	1.018	629	704	1.333	285	»
Debilidad congénita y vicios de conformación.....	357	24	381	574	23	597	216	»
Diarrea y enteritis.....	557	174	731	720	273	993	262	»
Otras causas.....	158	197	355	180	309	489	134	»
TOTAL.....	2.079	1.333	3.412	2.695	2.159	4.854	1.406	36

Los dispensarios de Puericultura al presente establecidos, los cuales tienen como fines primordiales, no solamente suministrar la leche a los infantes en las condiciones especiales que debe ser suministrada, al objeto de que a su digestión no se produzcan trastornos tan frecuentes y de consecuencias deplorables y regimentar la cantidad y número de tomas que deben ingerir, si que también, y precisamente la de mayor importancia, vigilar su nutrición e inculcar a las madres los medios que deben emplear en la lactancia, ya sea mixta, maternal o de otra clase, lo que ha reportado beneficios considerables, toda vez que los consejos de las especialidades médicas al frente de aquéllos ha traído como consecuencia un porcentaje cada día más inferior de mortalidad; hechos éstos que claramente se comprueban con examinar las cifras de mortalidad de los niños en los quinquenios de 1913, 1918 y 1923, en los que la proporción por 100 para los menores de un año fué de 19'42, 16'35 y 21'20, y para los de uno a cinco años de 16'47, 13'21 y 10'82, y en el de 1927, como anteriormente hicimos constar, su proporción quedó reducida a 13'95 y 8'95, cifras éstas altamente consoladoras, toda vez que la mortalidad infantil, según se demuestra en los cuadros que en relación con aquélla comprende el presente trabajo, tiene precisamente lugar en los dos primeros años de vida, más que por ninguna otra clase por mala alimentación, en muchos casos excesiva, que ocasiona las diarreas que tan gran contingente ofrecen a la mortalidad.

Las causas principales de la mortalidad infantil en los menores de dos años, no nos cansaremos de repetirlo, período lactante y comienzo de alimentación, por desconocimiento en las madres de la forma de cuidar a sus hijos, son producidas por la enteritis y afecciones del aparato respiratorio, lo cual evidencia una falta de educación sanitaria, pues que ambas, con los medios que la higiene y la ciencia médica dispone, si se acude a combatir las al iniciarse el más ligero trastorno en los niños, pueden reducirse a un índice de mortalidad muy inferior al que al presente nos ofrecen aquéllas.