

Distribución de la natalidad por meses en este año y en los cinco anteriores.

AÑO DE 1925		AÑO DE 1926		AÑO DE 1927	
MESES	NACIDOS	MESES	NACIDOS	MESES	NACIDOS
Enero.....	1.868	Enero.....	1.863	Marzo.....	1.916
Noviembre.....	1.737	Marzo.....	1.818	Enero.....	1.819
Diciembre.....	1.722	Febrero.....	1.729	Diciembre.....	1.817
Marzo.....	1.682	Diciembre.....	1.720	Noviembre.....	1.721
Octubre.....	1.616	Noviembre.....	1.698	Septiembre.....	1.598
Febrero.....	1.608	Octubre.....	1.688	Abril.....	1.596
Mayo.....	1.585	Abril.....	1.662	Julio.....	1.594
Julio.....	1.574	Julio.....	1.588	Octubre.....	1.582
Septiembre.....	1.538	Mayo.....	1.557	Mayo.....	1.531
Abril.....	1.514	Junio.....	1.551	Agosto.....	1.510
Junio.....	1.486	Septiembre.....	1.536	Junio.....	1.480
Agosto.....	1.449	Agosto.....	1.501	Febrero.....	1.437
TOTAL.....	19.399		19.911		19.601
Diferencia entre el de más y el de menos...	439		362		479

AÑO DE 1928		AÑO DE 1929		AÑO DE 1930	
MESES	NACIDOS	MESES	NACIDOS	MESES	NACIDOS
Diciembre.....	1.904	Enero.....	2.004	Enero.....	1.873
Enero.....	1.896	Diciembre.....	1.924	Diciembre.....	1.836
Febrero.....	1.856	Marzo.....	1.893	Marzo.....	1.822
Marzo.....	1.797	Julio.....	1.828	Octubre.....	1.753
Octubre.....	1.773	Noviembre.....	1.821	Julio.....	1.748
Noviembre.....	1.772	Febrero.....	1.772	Noviembre.....	1.716
Abril.....	1.707	Abril.....	1.749	Abril.....	1.675
Julio.....	1.700	Agosto.....	1.733	Septiembre.....	1.672
Junio.....	1.658	Junio.....	1.730	Agosto.....	1.666
Septiembre.....	1.619	Mayo.....	1.676	Febrero.....	1.656
Mayo.....	1.601	Septiembre.....	1.663	Mayo.....	1.653
Agosto.....	1.558	Octubre.....	1.663	Junio.....	1.585
TOTAL.....	20.841		21.456		20.655
Diferencia entre el de más y el de menos...	346		341		288

Las distintas épocas del año guardan íntima relación con la natalidad, muy especialmente los cambios de temperatura y demás trastornos atmosféricos; así podemos comprobar que si las estaciones de otoño e invierno adelantan sus fríos, y en el verano las temperaturas son excesivamente elevadas, aquélla, en la época correspondiente, resulta totalmente disminuida por no verificarse la procreación en condiciones normales; por el contrario, si la primavera se adelanta y las temperaturas son benignas, a los nueve meses siguientes se produce un gran aumento de natalidad, ofreciéndose otra importantísima ventaja, cual es la de ser casi nula la mortinatalidad, y a la inversa, con número muy considerable de los que fueron engendrados en los meses de enero y febrero, que además de ofrecer gran contingente a la mortalidad, son seres degenerados por vicios de origen, fáciles de comprender sin necesidad de concretarlos.