

Proporción por 100, por edades, en relación con el total de defunciones en el quinquenio último.

E D A D E S	AÑO 1927		AÑO 1928		AÑO 1929		AÑO 1930		AÑO 1931		AÑO 1932	
	Número de fallecidos.	Proporción por 100...	Número de fallecidos.	Proporción por 100...	Número de fallecidos.	Proporción por 100...	Número de fallecidos.	Proporción por 100...	Número de fallecidos.	Proporción por 100...	Número de fallecidos.	Proporción por 100...
Menores de un año.....	2.079	15'95	2.519	16'70	2.528	16'02	2.171	14'68	2.599	15'42	2.424	15'72
De 1 a 4 años.....	1.333	8'95	1.923	12'60	1.754	11'12	1.326	8'97	1.610	9'56	1.303	8'45
De 5 a 9 ídem.....	366	2'46	309	2'42	359	2'27	338	2'29	358	2'12	363	2'36
De 10 a 14 ídem.....	202	1'35	195	1'23	211	1'34	178	1'20	188	1'12	191	1'24
De 15 a 19 ídem.....	399	2'09	385	2'92	397	2'52	384	2'60	406	2'41	412	2'67
De 20 a 24 ídem.....	409	3'15	505	3'31	451	2'86	511	3'45	555	3'29	514	3'33
De 25 a 29 ídem.....	508	3'74	594	3'89	571	3'62	556	3'76	603	3'58	559	3'63
De 30 a 34 ídem.....	572	3'84	555	3'63	597	3'78	594	4'02	645	3'83	598	3'88
De 35 a 39 ídem.....	588	3'95	603	3'95	650	4'12	613	4'14	665	3'95	616	4'00
De 40 a 44 ídem.....	686	4'60	602	4'34	699	4'43	710	4'80	777	4'61	702	4'55
De 45 a 49 ídem.....	709	4'76	748	4'90	729	4'62	748	5'06	818	4'85	740	4'80
De 50 a 54 ídem.....	874	5'87	786	5'15	856	5'43	776	5'25	849	5'04	768	4'98
De 55 a 59 ídem.....	948	6'36	876	5'74	889	5'63	927	6'27	1.014	6'02	917	5'95
De 60 a 64 ídem.....	1.129	7'58	1.033	6'90	1.039	6'59	1.063	7'19	1.212	7'19	1.116	7'24
De 65 a 69 ídem.....	1.157	7'76	1.025	6'74	1.158	7'34	1.092	7'38	1.245	7'39	1.116	7'43
De 70 a 74 ídem.....	1.021	6'85	899	5'89	1.059	6'71	977	6'61	1.114	6'61	1.025	6'65
De 75 a 79 ídem.....	897	5'02	784	5'14	913	5'79	903	6'11	1.029	6'11	948	6'15
De 80 en adelante.....	913	6'13	743	4'87	905	5'74	907	6'13	1.152	6'84	1.064	6'90
Sin clasificación.....	7	0'05	14	0'09	10	0'07	13	0'09	10	0'06	11	0'07

Clasificación por grandes grupos de enfermedades de la mortalidad ocurrida en cada mes.

M E S E S	Fiebre tifoidea.	Gripe.	Tuberculosis pulmonar.	Bronquitis aguda.	Pulmonía.	Bronco-neumonía.	Orgánicas del corazón.	Enteritis en menores de dos años.
Enero.....	3	26	117	93	57	283	163	19
Febrero.....	2	27	111	86	48	250	168	25
Marzo.....	1	10	119	54	44	156	156	9
Abril.....	1	6	95	48	35	143	167	23
Mayo.....	2	3	93	32	33	130	139	19
Junio.....	3	4	110	25	21	98	133	50
Julio.....	1	2	96	21	25	66	112	133
Agosto.....	5	1	90	16	20	63	131	114
Septiembre.....	5	>	85	8	27	48	116	58
Octubre.....	4	3	87	14	35	91	147	28
Noviembre.....	5	7	83	20	29	78	143	20
Diciembre.....	4	7	94	62	30	141	152	13
TOTALES.....	36	96	1.180	479	404	1.547	1.727	511

Al verificar los correspondientes estudios con relación a la prolación por meses de la mortalidad hacíamos constar la influencia que las temperaturas ejercen en nuestro organismo, viéndose una vez más que en los meses de temperaturas benignas decrecen de una manera extraordinaria, ofreciendo, por el contrario, un enorme aumento aquellos meses en que son extremas, muy especialmente las enfermedades correspondientes a los aparatos circulatorio y respiratorio en los adultos, durante los meses de noviembre a febrero, y las diarreas y enteritis, durante los de julio y agosto, en los menores de dos años.